

包装表示変更のお知らせ

セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 注射用セフトアジジム

セフトアジジム 静注用 0.5g 「CHM」**セフトアジジム 静注用 1g 「CHM」****CEFTAZIDIME 「CHM」**
for Intravenous Injection

謹啓

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標題製品につきまして包装表示を変更いたします。

今後とも、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

＜変更内容＞

●個装箱天面の裏面の説明文書について、誤解を招きやすい表記となっているため、表記を変更します。

＜セフトアジジム 静注用 1g 「CHM」 個装箱天面の裏面の説明文書＞


変更前

本剤は溶解時に炭酸ガスが発生するため溶解後はわずかに陽圧になりますので次の通りに溶解して下さい。

- ① 約5mLの溶解液をバイアル内へ注入し、すぐ注射針を抜き取り振とうして溶解します。

【注意】


- (1) バイアル内へは約5mL以上の溶解液を注入しないこと。
(2) 通常の操作で約5mLの溶解液が容易に入らない場合は使用しないこと。



- ② 溶解後、バイアルを倒立にして、注射針を刺し、薬液を吸引します。

【注意】

- わずかに陽圧になっているので注射針の先が薬液面より上に出ないように刺入すること。
③ 静脈内投与に際しては、通常20mLに希釈して用いて下さい。




変更後

本剤は溶解時に炭酸ガスが発生するため溶解後はバイアル内が陽圧になりますので次の通りに溶解して下さい。

- ① 約5mLの溶解液をバイアル内へ注入し、すぐ注射針を抜き取り振とうして溶解します。

【注意】


- (1) バイアル内へは約5mL以上の溶解液を注入しないこと。
(2) 通常の操作で約5mLの溶解液が容易に入らない場合は使用しないこと。



- ② 溶解後、注射針を刺入します。その際、あらかじめバイアル内の陽圧分のガスをシリンジに引いておきます。その後バイアルを倒立にして、薬液を吸引します。

【注意】

- バイアル内が陽圧となるため操作に支障を来す場合は、ガス抜きを行いながら薬液を吸引して下さい。
③ 静脈内投与に際しては、通常20mLに希釈して用いて下さい。



・セフトアジジム 静注用 0.5g 「CHM」 につきましても、同様に變更いたしますのでよろしくお願い申し上げます

<対象製品>

製品名	包装	初回製造番号	使用期限	出荷予定時期
セフタジジム静注用 0.5g「CHM」	10V	CZH5301	2027/2	未定
セフタジジム静注用 1g「CHM」	10V	CZQ5101	2026/12	2025/7

・新包装品の出荷時期につきましては、在庫状況により出荷予定時期と前後することがございますが、何卒ご了承の程
お願い申し上げます。

以上

<お問い合わせ先>

株式会社ケミックス 学術部
TEL 0120-769-031／FAX 045-476-9034
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・当社休日を除く）